

Patient Information

Polish

Leczenie oczu

Podczas badania i leczenia oczu często zachodzi konieczność stosowania kropli do oczu, które mogą mieć wpływ na zdolność widzenia.

Są to na przykład:

- Znieczulające krople do oczu, które służą do uśmierzania bólu. Ich działanie może trwać kilka godzin. Nie wpływają one na zdolność widzenia, ale może zostać założony na oko opatrunek, którego zadaniem jest zapobieganie przypadkowemu dotknięciu oka przez pacjenta. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn z opatrunkiem na oku. Można zdjąć opatrunek na czas prowadzenia pojazdu, ale należy zadbać o zamknięcie okien pojazdu, aby uniknąć dostania się do oka kurzu lub pyłu.

Jeśli jednak problem z oczami w jakikolwiek sposób wpływa na jakość widzenia, nie wolno prowadzić pojazdów.

- Krople, które są stosowane, aby powiększyć źrenicę oraz rozluźnić oko. Efekty mogą utrzymywać się przez 1 lub 2 dni. Pacjenci będą widzieć nieostro, a jasne światła będą wydawały się im bardzo jasne. W żadnym wypadku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
- Do otrzymania zarysu zadrapań na powierzchni oka może zostać wykorzystany pomarańczowy barwnik. Nie wpływa on na jakość widzenia.
- Krem lub krople z antybiotykiem mogą na parę chwil spowodować nieostre widzenie. Powinno to szybko ustąpić po zamruganiu powiekami



Patient Information

Polish

Pacjenci, którym założono opatrunek na oko, powinni pamiętać o tym, aby oko pod opatrunkiem było **zamknięte** — dzięki temu powieka chroni oko.

Przed kontaktem z oczami, a także po jego zakończeniu, należy umyć ręce.

Dotrzymywanie ustalonego terminu kolejnej wizyty jest niezwykle ważne.

Dodatkowe porady i informacje

Oddział ratunkowy (Emergency Department) 01935 384 355

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać tę ulotkę w innym formacie, na przykład dużym drukiem, prosimy zadzwonić na numer telefonu:

01935 384 256

